

វដ្តរដូវ



វដ្តរដូវចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលក្មេងស្រីមានអាយុចន្លោះពី ១០ ទៅ ១៦ ឆ្នាំ ឬយឺតជាងនេះអាចដល់អាយុ ១៧ ឆ្នាំ។ វដ្តរដូវមានរយៈពេលចន្លោះពី ២១ ទៅ ៣៥ ថ្ងៃ ដែលរយៈពេលជាមធ្យមគឺ ២៨ ថ្ងៃ (១ខែ)។ វដ្តរដូវមាន ៤ ដំណាក់កាលសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

៨) ដំណាក់កាលឈានទៅរកការធ្លាក់ឈាមរដូវ


គឺជាដំណាក់កាលដែលស្រ្តីទាប់ភ្លាសសើមស្បូនឡើងក្រាស់ខ្លាំងត្រៀមសម្រាប់ការមានគភ៌ ក្នុងករណីដែលគ្មានការបង្កកំណើតភ្លាសទាំងនេះក៏ជាចំណុចបង្កើតបានជាឈាមរដូវហូរចេញមកតាមទ្រព្យមាននៅថ្ងៃមករដូវ ។

១) ដំណាក់កាលធ្លាក់ឈាមរដូវ

គឺជាដំណាក់កាលដែលមានហូរឈាមលាបលំដាប់មួយកំទេចភ្លាសសើមស្បូនតាមទ្រព្យមានមកក្រៅហៅថាការមករដូវ ដែលជាធម្មតាមានរយៈពេលពី ៣ ទៅ ៧ ថ្ងៃ ។



អូវុលនឹងស្លាប់ប្រសិនបើមិនបានធ្វើការបង្កកំណើតជាមួយមេជីវិតឈ្មោលក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងបន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ជូនពីអូវុល។



៣) ដំណាក់កាលបញ្ចេញមេជីវិតញី

គឺជាថ្ងៃដែលអូវុលបញ្ចេញស៊ីតទុំ (អូវុល) មកក្នុងដៃស្បូនរង់ចាំការបង្កកំណើតជាមួយមេជីវិតឈ្មោល ។

២) ដំណាក់កាលត្រៀមបញ្ចេញមេជីវិតញី

គឺជាដំណាក់កាលមួយ ដែលអូវុលមូលភ្នំចាប់ផ្តើមកើនឡើង ឆ្ពោះឱ្យអូវុលមានដំណើរការលើការទំននស៊ីត (អូវុល) ហើយត្រៀមបញ្ចេញមកក្នុងដៃស្បូន ។

ស្វែងយល់អំពីវដ្តរដូវ

អត្ថប្រយោជន៍នៃការដឹងពីរយៈពេលនៃវដ្តរដូវរបស់ខ្លួន

- កំណត់បានថាតើវដ្តរដូវរបស់អ្នកទៀងទាត់ឬអត់
- ជួយអ្នកក្នុងការតាមដាន និងងាយស្រួលក្នុងការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់ការមករដូវក្នុងខែបន្ទាប់ ។
- អាចប៉ាន់ប្រមាណនៃថ្ងៃធ្លាក់រដូវ ដែលជួយបង្កើនឱកាសនៃការមានគភ៌ ឬក៏អាចប្រើជាវិធីពន្យារកំណើតដែលគេហៅថាជា " វិធីសាស្ត្រពន្យារកំណើតតាមបែបប្រតិទិន" ប្រសិនបើអ្នកមានវដ្តរដូវទៀងទាត់។
- តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមចងចាំថាការពន្យារកំណើតតាមបែបប្រតិទិន គឺមិនមានប្រសិទ្ធភាព ១០០% ទេ ដែលឱកាសក្នុងការមានគភ៌នៅតែអាចកើតមានឡើងខ្ពស់។



ការប៉ាន់ប្រមាណថ្ងៃធ្លាក់មេជីវិតញី(អូវុល) Ovulation

ជាទូទៅការបញ្ចេញស៊ីត(អូវុល)កើតឡើងមុនពេលមករដូវ២សប្តាហ៍។ នេះជាមូលហេតុ ដែលយើងតែងតែនិយាយថា ការបញ្ចេញស៊ីតកើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៤នៃវដ្តរដូវចំពោះស្ត្រី ដែលមានវដ្តរដូវ២៨ថ្ងៃ។ តួយ៉ាងប្រសិនបើស្ត្រីមានវដ្តរដូវខ្លីជាង ២៨ថ្ងៃ នោះការបញ្ចេញស៊ីតកើតឡើងមុនថ្ងៃទី ១៤ នៃវដ្តរដូវ។ ផ្ទុយទៅវិញបើស្ត្រីមានវដ្តរដូវវែងជាង ២៨ ថ្ងៃ នោះការបញ្ចេញស៊ីតកើតឡើងនៅក្រោយថ្ងៃទី ១៤ នៃវដ្តរដូវវិញ។

ដូចនេះ ថ្ងៃធ្លាក់អូវុល = រយៈពេលវដ្តរដូវ - ១៤ ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអ្នកមានវដ្តរដូវ ២៨ ថ្ងៃ

⇒ ថ្ងៃធ្លាក់អូវុលរបស់អ្នកគឺ ២៨ - ១៤ = ១៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៤ តុលា ២០២២ ។

ថ្ងៃមានរដូវ (ថ្ងៃទី១នៃវដ្ត ៖ ៣១ តុលា ២០២២)

ថ្ងៃធ្លាក់អូវុល (ថ្ងៃទី១៤នៃវដ្តរដូវ)

៣១	១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤
១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០	២១	២២	២៣	២៤	២៥	២៦	២៧	២៨	២៩

ថ្ងៃទី១នៃវដ្តរដូវក្នុងខែបន្ទាប់ (២៩ វិច្ឆិកា ២០២២)

ការគណនារយៈពេលក្នុងមួយវដ្តរដូវ និងការប៉ាន់ប្រមាណថ្ងៃមករដូវក្នុងខែបន្ទាប់

❖ គណនារយៈពេលក្នុងមួយវដ្តរដូវដោយប្រើប្រតិទិន៖ ធ្វើការកត់ត្រា និងរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទីមួយនៃការមករដូវរហូត ដល់មុនមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្លាក់ឈាមរដូវក្នុងខែបន្ទាប់ ដើម្បីដឹងពីរយៈពេល (ចំនួនថ្ងៃ) ក្នុងមួយវដ្តរដូវរបស់អ្នក ។ អ្នកអាចតាមដានវដ្តរដូវរបស់អ្នកចំនួន ៣ខែជាប់ៗគ្នា ដើម្បីដឹងពីរយៈពេលជាមធ្យមនៃវដ្តរដូវរបស់អ្នក។

សូមមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម ៖ ឧបមាថាអ្នកធ្លាក់ឈាមរដូវនៅថ្ងៃទី ៣១ តុលា ២០២២ រួចមានរដូវម្តងទៀតនៅថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា ២០២២ ។

ថ្ងៃមានរដូវ (ថ្ងៃទី១នៃវដ្តរដូវ គឺ ៣១ តុលា ២០២២)

(រាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ តុលា ២០២២ ដល់ ថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា ២០២២ => វដ្តរដូវមានរយៈពេល ២៨ថ្ងៃ។)

៣១	១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤
១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០	២១	២២	២៣	២៤	២៥	២៦	២៧	២៨	២៩

ថ្ងៃទី១នៃវដ្តរដូវក្នុងខែបន្ទាប់ គឺ ២៩ វិច្ឆិកា ២០២២

(ខែវិច្ឆិកា៖ រាប់ពីថ្ងៃ ២៩ វិច្ឆិកា ២០២២ ដល់ ២៨ ធ្នូ ២០២២ => វដ្តរដូវមានរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ។)

២៩	៣០	១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤
១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០	២១	២២	២៣	២៤	២៥	២៦	២៧	២៨	២៩	

ថ្ងៃទី១នៃវដ្តរដូវក្នុងខែបន្ទាប់

(ខែធ្នូ៖ រាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ធ្នូ ២០២២ ដល់ ២៦ មករា ២០២៣ => វដ្តរដូវមានរយៈពេល ២៨ថ្ងៃ។)

២៩	៣០	១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	២៩
១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០	២១	២២	២៣	២៤	២៥	២៦	២៧

⇒ វដ្តរដូវជាមធ្យម គឺ (២៨+៣០+២៨)÷ ៣= ២៨,៣៣ ថ្ងៃ (បង្អត់ចុះនៅត្រឹម ២៨ ថ្ងៃ) ។

❖ ប៉ាន់ប្រមាណថ្ងៃមករដូវក្នុងខែបន្ទាប់៖ ប៉ាន់ប្រមាណថ្ងៃដោយយកវដ្តរដូវជាមធ្យមរបស់អ្នកជាគោល។

⇒ ដូច្នេះអ្នកប្រហែលជាមករដូវម្តងទៀតនៅថ្ងៃទី ២៥ កុម្ភៈ ២០២៣ ដោយរាប់ពីថ្ងៃទី២៧ មករា ២០២៣ ជាថ្ងៃទី១បន្តមកមុខឱ្យគ្រប់ចំនួន ២៨ ថ្ងៃ (រយៈពេលវដ្ត) + ១ថ្ងៃ ។

ថ្ងៃទី១នៃវដ្តរដូវក្នុងខែមករា

២៧	២៨	២៩	៣០	១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១
១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០	២១	២២	២៣	២៤	២៥	២៦



- ❖ វដ្តរដូវមិនទៀងទាត់សម្រាប់ស្ត្រីដោយធម្មតា៖
 - វដ្តរដូវរបស់អ្នកតិចជាង ២១ ថ្ងៃ ឬច្រើនជាង ៣៥ ថ្ងៃ ។
 - អ្នកខកខានវដ្តរដូវ (ប្រាក់រដូវតែមិនមែនដោយសារមានផ្ទៃពោះ)។
 - ការធ្លាក់ឈាមរដូវ (ការមករដូវ) របស់អ្នកមានរយៈពេលយូរជាង ៧ ថ្ងៃ។
- ❖ វដ្តរដូវអាចប្រែប្រួល ឬខកខាននៅពេល៖
 - មានការថប់អាស្រ័យ
 - មានរបបអាហារមិនត្រឹមត្រូវ
 - បម្រែបម្រួលផ្សេងៗក្នុងរាងកាយ (ការប្រែប្រួលអ័រម៉ូន ឬមានផ្ទៃពោះជាដើម)
 - មានបញ្ហាសុខភាព។ ល ។

រៀបរៀងដោយ៖

គាំទ្រដោយ៖

